Box size: 6.5 x 9.25
Overall size: 18 x 18
Folds to: 6 x 9

COVIDIEN

V-Loc™ 180
Absorbable Wound Closure Device

1302634

PL

Wchłaniane narzędzie zamykania ran

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZESTUDIOWAĆ PONIŻSZE INFORMACJE.

WAŻNE!

Nieprzejrzyste ochronne opakowanie, przetrzymywane i wyprowadzane wyłącznie przy zachowaniu ostrożności. Produkt jest jałowy. Nie przechowywać nieprzejrzystego urządzenia mocno powodzi dla jego wyjęcia z nieprzejrzystego opakowania. Produkt jest jałowy. Nie przechowywać w zbyt gorącym miejscu. Nie używać produktu po upływie daty ważności. Jednorazowego użytku. Nie ponownie przetwarzać. Nie ponownie sterylizować. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

OPIS

Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 składa się z łącznika wykonanego z syntetycznego kopolimeru kwasu mlekowego i węglowego (wszystkie składniki są biodegradowalne). Dodatkowo z wykorzystaniem łącznika (uchwytu) dołączonego do każdego produktu. Barbs (kolce) znajdujące się na powierzchni wewnętrznej łącznika (uchwytu) są przeznaczone do zatrzymywania tkanek. Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest dostępne w pojedynczym opakowaniu z igłą o różnej długości. Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest przeznaczone do zamykania ran o małym i średnim stopniu rozwarcia. Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest w pełni wchłaniane przez organizm w ciągu 180 dni po zastosowaniu. Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest przeznaczone do zamykania ran o małym i średnim stopniu rozwarcia. Wchłaniane narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest w pełni wchłaniane przez organizm w ciągu 180 dni po zastosowaniu.

Kanwa: 6 x 9 cm

Wymiary igły	Kanwa Taper	Kanwa Taper Reverse
0	1	1/2 180
2	2	2-0 / 2-0 180
3	3	3-0 / 3-0 / 3-0 / 3-0 180
4	4	4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 / 4-0 180

Kanwa: dłuższy materiał szyjący (per) niż standardowa długość kanwa, Tabela 1

U.S.P. Rozmiar	U.S.P. Rozmiar Taper	Maksimum długość Igły (mm)
0	0.25 - 0.399	6.35
2-0	0.50 - 0.559	8.50
3-0	0.60 - 0.699	9.96
4-0	0.70 - 0.799	9.95

WSKAZANIA

Stosowanie wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 jest wskazane przy przybliżeniu tkanek miękkich o małym i średnim stopniu rozwarcia i przy wchłanianiu.

PRZECIWWSKAZANIA

Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 nie powinno być stosowane w: 1. Zakażeniach ran 2. Wszystkich sytuacjach, w których wchłanianie narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 jest niewskazane.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 jest wskazane do zamykania tkanek miękkich o małym i średnim stopniu rozwarcia. Nie należy stosować wyższej dawki niż zalecana. Nie należy stosować wyższej niż zalecana liczby zamykanych ran.
2. Nie wykonywać ponownie. Jałowe. Do opakowania nie zostało dodane żadne antybiotyczne lub bakteriostatyczne środki konserwujące. Nie należy ponownie sterylizować. Nie należy ponownie przetwarzać. Długotrwałe stosowanie lub ponowne użycie może prowadzić do pogorszenia wyrobu.
3. Przed zastosowaniem wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180, szczegółowo zbadać opakowanie i produkt. Nie używać, jeśli opakowanie lub produkt są uszkodzone. Produkt jest jałowy, jeśli opakowanie jest nienaruszone. Nie używać produktu po upływie daty ważności.
4. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 należy ostrożnie wyjąć ze opakowania i ostrożnie obsłużyć, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.
5. Nie zastosowano badań dotyczących wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 u kobiet w ciąży, karmiących kobiet i dzieci.
6. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
7. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 nie powinno być stosowane w: 1. Zakażeniach ran 2. Wszystkich sytuacjach, w których wchłanianie narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 jest niewskazane.
8. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
9. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
10. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
11. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
12. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
13. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
14. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
15. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
16. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
17. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
18. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
19. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
20. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
21. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
22. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
23. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
24. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
25. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
26. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
27. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
28. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
29. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
30. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
31. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
32. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
33. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
34. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
35. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
36. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
37. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
38. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
39. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
40. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
41. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
42. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
43. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
44. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
45. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
46. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
47. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
48. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
49. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
50. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
51. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
52. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
53. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
54. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
55. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
56. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
57. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
58. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
59. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
60. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
61. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
62. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
63. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
64. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
65. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
66. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
67. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
68. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
69. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
70. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
71. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
72. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
73. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
74. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
75. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
76. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
77. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
78. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
79. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
80. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
81. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
82. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
83. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
84. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
85. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
86. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
87. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
88. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
89. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
90. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
91. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
92. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
93. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
94. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
95. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
96. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
97. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
98. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
99. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.
100. Wchłaniające narzędzie do zamykania ran V-Loc™ 180 powinno być stosowane zgodnie z zasadami aseptyki i zasadami dobrej praktyki medycznej. Wybór rozmiaru i rodzaju wchłaniającego narzędzia do zamykania ran V-Loc™ 180 powinien być dokonany przez lekarza specjalistę.

TR

Emilebilir Yara Kapatma Aracı

DİKKİ KULLANMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUYUN.

ÖNEMLİ!

Steril olmayan ambalajlarda saklanmalı ve kullanılmalıdır. Cerrahi eldiven için ile kapsamı kullanılmalıdır.

Bu ürün, ambalaj içerisinde bulunduğunda ürünü sıcaklığına, nem etkileş ve dondurulmuş bu ürünün steriliyle kullanılmalıdır. Ürünü sterilize etmeyin. Ürünü yeniden sterilize etmeyin. Ürünü yeniden kullanmayın. Ürünü yeniden kullanmayın. Ürünü yeniden kullanmayın