Box size: 2.25 x 5
Overall size: 18 x 14
Folds to: 2.25 x 4.8333

COVIDIEN™

Ti-Cron™
Coated Braided Polyester

1300383

EN

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY:

DESCRIPTION
Ti-Cron™ braided polyester suture are sterilizable, sterile, surgical sutures composed of Polyethylene Terephthalate. They are prepared from fibers of high molecular weight, long chain, linear polyesters having recurrent aromatic rings as an integral component. Ti-Cron™ braided sutures are available coated uniformly with silicone to increase surface lubricity, thereby enhancing handling characteristics, ease of passage through tissue, and knot run-down properties. Ti-Cron™ sutures are inert and elicit only minimal tissue reaction. Ti-Cron™ braided sutures are coated with SIMC Blue No. 6 colorant or uncoated (white).

Ti-Cron™ sutures meet all requirements established by the United States Pharmacopeia (USP) and the European Pharmacopeia (EP) for nonabsorbable surgical sutures.

INDICATIONS
Ti-Cron™ polyester sutures are indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurological surgery.

ACTIONS
Ti-Cron™ polyester sutures elicit a minimal acute inflammatory reaction in tissues, followed by gradual encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. Ti-Cron™ polyester sutures are not absorbed, not to any significant change in tensile strength retention known to occur in vivo.

CONTRAINDICATIONS
None known.

WARNINGS
As with any foreign body, prolonged contact of any suture with soft tissues may result in calcium deposits.

Do not resterilize. Sterile sutures packaging has been opened or damaged. Discard opens unused sutures. Store at room temperature. Avoid prolonged exposure to elevated temperatures.

Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving sutures before employing Ti-Cron™ polyester braided suture. Improper wound closure, as the risk of wound dehiscence may vary with the skill of application and the suture material used.

Acceptable surgical practice must be followed with respect to drainage and closure of infected or contaminated wounds.

PRECAUTIONS
In handling Ti-Cron™ polyester suture material, care should be taken to avoid damage from handling. Avoid crushing or crimping the suture by application of surgical instruments such as forceps or needle holders.

Adequate tissue security requires the use of surgical technique of flat square ties, with additional throws as warranted by surgical circumstances and the experience of the surgeon. The use of additional throws may be particularly appropriate when knotting moistened suture.

ADVERSE REACTIONS
Adverse effects, which may be associated with the use of this product, include wound dehiscence; calcific formation when prolonged contact with soft solutions occurs; enhanced bacterial infectivity; minimal acute inflammatory reaction, and localized tissue irritation.

HOW SUPPLIED
Ti-Cron™ polyester sutures are available uncoated (white) or dyed with SIMC Blue No. 6 sterilized, coated, in sizes 12 (7 Metric) through 10-0 (0.4 Metric) on a variety of needles and in various lengths. Ti-Cron™ polyester suture needles are offered in various needle types using both premium and removable needle attachment techniques. The sutures are available in bulk boxes (Product Codes: 1-6 Metric Sizes). Ti-Cron™ polyester sutures are also available with PTFE (polytetrafluoroethylene) pledgets for use as a pledgeted suture. The suture ends are the finest suture to increase the ball bearing area.

FR

En polyester, tressé et enduit

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-DESSOUS.

DESCRIPTION
Les sutures en polyester tressées Ti-Cron™ sont des sutures chirurgicales stériles non résorbables, composées de Polyéthylène Téréphthalate. Elles sont préparées à partir de fibres de polyesters linéaires à longue chaîne et à haute masse moléculaire, possédant des noyaux aromatiques périodiques. Les sutures tressées Ti-Cron™ sont enduites uniformément de silicone, ce qui vient accroître la lubrifiance de surface, facilitant ainsi la manipulation, le passage à travers les tissus et le nœud qui se défait. Les sutures Ti-Cron™ sont inertes et ne provoquent qu'une réaction tissulaire minimale du tissu. Les sutures Ti-Cron™ sont teintées avec le colorant SIMC Bleu N° 6 ou incolores (blanches).

Les sutures Ti-Cron™ satisfont à toutes les conditions prescrites par la Pharmacopée américaine (USP – United States Pharmacopeia) et la Pharmacopée européenne (EP – European Pharmacopeia) pour les sutures chirurgicales non résorbables.

INDICATIONS
Les sutures en polyester Ti-Cron™ sont généralement indiquées pour le rapprochement de tissus mous et/ou pour la ligature, y compris en chirurgie cardiovasculaire, ophtalmologique et en neurochirurgie.

ACTIONS
Les sutures en polyester Ti-Cron™ provoquent une réaction inflammatoire aiguë minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation graduelle de la suture par du tissu conjonctif fibreux. Elles ne sont pas résorbées et ne vont pas au-devant d'un gain significatif de résistance à la traction, tel que cela a été observé in vivo.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue à ce jour.

MISES EN GARDE
Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé d'une suture avec des solides tissus peut provoquer la formation de calculs.

Ne pas stériliser. Stérile conditionnement ou l'emballage ou que ainsi que ou endommagé. Mettre au rebut les sutures ouvertes non utilisées. Conserver à température ambiante. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.

Avant d'utiliser les sutures non résorbables en polyester Ti-Cron™ pour la ligature de plaies, les utilisateurs doivent être familiarisés avec les procédures et techniques chirurgicales impliquant les sutures. En effet, le risque de déhiscence de la blessure peut varier en fonction du site d'application et du matériau de suture utilisé.

Les pratiques chirurgicales standards doivent être observées concernant le drainage et la fermeture des plaies contaminées ou infectées.

PRÉCAUTIONS
Manipuler avec précaution le matériau de suture pour éviter de les endommager. Éviter les écrasements ou aplatissements dus à l'utilisation d'instruments chirurgicaux tels que des pinces ou des aiguilles.

La fixation des nœuds de sécurité appropriés requiert une technique chirurgicale dérivée : nœuds carrés plats, avec des nœuds supplémentaires jugées par l'environnement chirurgical et l'expérience du chirurgien. Lorsque des nœuds additionnels peuvent être particulièrement appropriés lorsqu'il s'agit de nouer des monofilaments.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables pouvant être associés à l'utilisation de ce produit comprennent : la déhiscence de la plaie; la formation de calculs lorsque le matériau séjourne de manière prolongée en milieu salin; une infection bactérienne accrue; une réaction inflammatoire aiguë minime et une irritation locale ponctuelle.

PRÉSENTATION
Les sutures en polyester Ti-Cron™ sont incolores (blanches) ou teintées avec le colorant SIMC Bleu N° 6. Elles sont stérilisées, enduites et disponibles aux formats 12 (Metric 7) à 10-0 (Metric 0,4) sur une gamme d'aiguilles et de longueurs variées. Les aiguilles des sutures en polyester Ti-Cron™ sont proposées dans plusieurs types d'aiguilles grâce à des techniques de fixation permanentes ou amovibles. Elles sont conditionnées en boîtes d'une dix douzaine de fils (sutures). Les sutures en polyester Ti-Cron™ sont également disponibles avec des compresses en PTFE (polytétrafluoroéthylène) afin d'offrir comme tampons entre à zone de suture et la surface du tissu pour renforcer la zone de drainage.

DE

Beschichtetes geflochtenes Polyester

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTES SIND DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCHZULESEN:

BESCHREIBUNG
Die geflochtenen Polyester Nahtmaterial Ti-Cron™ ist nicht resorbierbares steriles chirurgisches Nahtmaterial aus Polyethylenterephthalat. Sie werden aus Fasern hochmolekularen und hohen Molekulargewicht hergestellt, die sich wiederholende aromatische Ringe als integrierte Bestandteil besitzen. Die geflochtene Nahtmaterialien sind gleichmäßig mit Silikon beschichtet, um die Oberflächenschmierung zu erhöhen, wodurch die Handhabungseigenschaften, die Durchgängigkeit durch das Gewebe und die Knotenfestigkeit verbessert werden. Die Ti-Cron™ Nahtmaterialien ist inert und löst lediglich eine minimale Gewebe Gewebereaktion hervor. Ti-Cron™ Nahtmaterialien sind mit SIMC Blau No. 6 Farbstoff oder unbeschichtet (weiß).

Ti-Cron™ Nahtmaterial erfüllt alle Anforderungen der US-Pharmakopöe (USP) und der Europäischen Pharmakopöe (EP) für nichtresorbierbares chirurgisches Nahtmaterial.

INDIKATIONEN
Ti-Cron™ Polyester Nahtmaterial ist indiziert zur allgemeinen Adaption und/oder Ligation von Weichgewebe, darunter auch bei kardiovaskulären, ophthalmologischen und neurologischen Eingriffen.

WIRKUNGSWEISE
Ti-Cron™ Polyester Nahtmaterial ruft eine minimale akute entzündliche Gewebereaktion hervor, auf die eine schnelle Verkapselung des Nahtmaterials durch fibrotisches Bindegewebe folgt. Ti-Cron™ Polyester Nahtmaterial ist nicht resorbierbar und ist auch keine entdeckbare Veränderung der Zugfestigkeit in vivo bekannt.

KONTRAINDIKATIONEN
Nicht bekannt.

WARNHINWEISE
Wie bei allen Fremdkörpern kann längerer Kontakt des Nahtmaterials mit Weichgewebe Ablagerungen verursachen.

Nicht erneut sterilisieren. Bei verpackungen oder unbeschädigter Packung steril. Geöffnete, nicht verwendete Nahtmaterial entsorgen. Bei Raumtemperatur lagern.

Nicht über längere Zeit hohen Umgebungstemperaturen aussetzen.

Die Verwender müssen mit den chirurgischen Verfahren und Techniken für Nähten vertraut sein, bevor sie Ti-Cron™ Polyester Nahtmaterial verwenden. Die Wundheilung hängt von der Fähigkeit des Anwenders und dem verwendeten Nahtmaterial ab.

Im Hinblick auf Drainage und Verschluss infizierter oder kontaminierter Wunden sind die gegebenen chirurgischen Regeln einzuhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bei jeder Nahtmaterial ist auch dann Nahtmaterial sorgfältig zu behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Quetsch- oder Knickschäden durch chirurgische Instrumente wie Gewebezangen oder Nadelhalter vermeiden.

Für eine ausreichende Knotensicherheit sind gegebenen chirurgische Techniken, wie z. B. flache Schiffknoten mit zusätzlichen Knotenwurfen erforderlich. Es sind die dem chirurgischen Eingriffsbereich und der Erfahrung des Chirurgen. Zusätzliche Knotenwurfe können insbesondere bei nassen monofilen Nahtmaterial angebracht sein.

UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN
Zu den möglichen unerwünschten Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Einsatz dieses Produkts gehören: u. a. Wundheilstörungen; Verkalkung bei längerem Kontakt mit weichgewebe; Zunehmen; erhöhte Infektiosmacht durch Bakterien; minimale akute entzündliche Reaktion und lokalisierte Gewebereizung.

LIEFERUNG
Ti-Cron™ Polyesternahtmaterial aus Polyester ist ungefärbt (weiß) erhältlich oder mit SIMC Blau No. 6 gefärbt, sterilisiert, beschichtet und in den Größen 12 (Metric 7) bis 10-0 (Metric 0,4) verfügbar. Das Nahtmaterial wird mit, angebrachtem Langen sowie auf Lagerungsspulen, ohne Nadeln oder mit verschiedenen Nadeltypen verfügbar. Sowohl mit permanenten als auch verbindbaren Nadelbefestigungsteilen gefertigt, und zwar in Karton in ein, zwei und drei Dutzend. Das Ti-Cron™ Nahtmaterial ist in Packungen mit Gebrauchsanweisung und Verwendungsinformationen erhältlich, die den Nähten zusätzlich Informationen zur Ti-Cron™ Naht mit Polyester Nahtmaterial und Gewebedichtpflaster verwendet werden können, um die Belastungsfähigkeit zu verbessern.

IT

Poliestere intrecciato rivestito

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

DESCRIZIONE
Le suture in poliestere intrecciato Ti-Cron™ sono suture chirurgiche sterili non assorbibili, composte di Polietilene tereftalato. Sono preparate a partire da fibre di poliestere lineari ad alta gran molecolare, a catena lunga con isotermi anelli aromatici come componente integrante. La suture intrecciate Ti-Cron™ sono rivestite uniformemente di silicone per aumentare la lubrificazione della superficie e quindi migliorare le caratteristiche di maneggevolezza, la facilità di passaggio nei tessuti e le proprietà di scorrevolezza del nodo. Le suture Ti-Cron™ sono inerti e provocano una minima reazione tissutale. Le suture Ti-Cron™ sono disponibili colorate con SIMC Blu N. 6 o colorate (bianco).

Le suture Ti-Cron™ soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla Farmacopea statunitense (USP) e da quella europea (EP) per suture chirurgiche non assorbibili.

INDICAZIONI
Le suture in poliestere Ti-Cron™ sono indicate per l'uso nell'approssimazione e/o legatura di tessuti molli, ivi compresa l'uso nella chirurgia cardiovascolare, oftalmica e neurologica.

EFFETTI
Le suture in poliestere Ti-Cron™ provocano una minima reazione infiammatoria acuta nei tessuti, seguita da incapsulamento graduale della suture da parte del tessuto connettivo fibroso. Le suture in poliestere Ti-Cron™ non vengono assorbite, né si rileva alcuna variazione significativa della forza tensile, in vivo.

CONTROINDICAZIONI
Non esistono.

AVVERTENZE
Come per qualsiasi corpo estraneo, il contatto prolungato di qualsiasi suture con soluzioni salini può determinare la formazione di calcio.

Non sterilizzare di nuovo. Sterile, se la confezione della sutura non è aperta o non è danneggiata. Le suture aperte ma non usate vanno smaltite. Conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.

Prima di utilizzare le suture non assorbibili in poliestere Ti-Cron™ per la legatura di tessuti, gli utilizzatori devono essere familiari con le tecniche e le tecniche chirurgiche che riguardano le suture. Il rischio di dehiscenza della ferita può variare in funzione sia dalla capacità di applicazione della sutura sia dal materiale di sutura usato.

È pertanto necessario osservare una corretta pratica chirurgica nel posizionamento di drenaggi e nella chiusura di ferite infette o contaminate.

PRECAUZIONI
Prima di usare il materiale per suture, occorre prestare attenzione a non danneggiare la sutura durante la manipolazione. Non schiacciare o piegare la sutura con strumenti chirurgici, quali pinze o porta-aghi.

Il nodo sicuro richiede una tecnica chirurgica piatta, quadrata, con nodi aggiuntivi, a seconda delle circostanze chirurgiche e dell'esperienza del chirurgo. Il ricorso a nodi aggiuntivi può essere particolarmente appropriato per il nodo con materiali monofilamento.

REAZIONI AVVERSE
Gli effetti indesiderati che possono essere associati all'impiego di questo prodotto comprendono: dehiscenza della ferita; formazione di calcioli in condizioni di contatto prolungato a soluzione salina; aumentata infettività dei batteri; lieve reazione infiammatoria acuta e irritazione locale puntiforme.

COME È FORNITO
Le suture in poliestere Ti-Cron™ incolorate o disposte sono lingotto (bianco) o tinte SIMC Blu N. 6, sterilizzate, rivestite e non rivestite, nei formati 12 (Metric 7) e 10-0 (Metric 0,4) su una varietà di aghi e di lunghezze. Gli aghi delle suture in poliestere Ti-Cron™ sono disponibili in più tipi di aghi, con attacco permanente o a cloaca. Le suture sono disponibili in confezione da una, due e tre douzaine. Le suture in poliestere Ti-Cron™ sono anche dotate di confezione con prodotto per medicazione in PTFE (polytetrafluoroethylene) da utilizzare come tamponi per la cura della sutura e per ridurre la tensione sul materiale. Le estremità di sutura sono le più sottili per aumentare la superficie di cuscinetto a sfera.

ES

Poliéster trenzado revestido

LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN
Las suturas trenzadas Ti-Cron™ de poliéster son suturas quirúrgicas no absorbibles y estériles compuestas de tereftalato de polietileno. Están fabricadas a partir de fibras de poliéster de bajo peso molecular y cadena larga, con anillos aromáticos recurrentes como componente integral. La suturas trenzadas Ti-Cron™ están revestidas uniformemente con silicona para de la mencionada lubricidad superficial, mejorando así las características de manejo, la facilidad de paso a través de los tejidos y las propiedades de deslizamiento del nudo. Las suturas Ti-Cron™ son inertes y producen una reacción mínima del tejido. Las suturas de poliéster Ti-Cron™ están disponibles teñidas con colorante SIMC Azul No. 6 o incoloras (blanco).

Las suturas Ti-Cron™ cumplen todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) y la Farmacopea de Europa (EP) para suturas quirúrgicas no absorbibles.

INDICACIONES
Las suturas de poliéster Ti-Cron™ están indicadas para uso en ligaciones o aproximación de tejidos blandos en general, incluyendo cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.

ACCIONES
Las suturas de poliéster Ti-Cron™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en los tejidos, seguida de una lenta encapsulación del material de sutura por parte de tejido conectivo fibroso. Las suturas de poliéster Ti-Cron™ no se absorben, ni se ha observado ningún cambio significativo en la resistencia a la tracción en los tejidos.

CONTRAINDICACIONES
Las suturas Ti-Cron™ no deben usarse en ningún caso.

ADVERTENCIAS
El contacto prolongado de una sutura con soluciones salinas, igual que con cualquier cuerpo extraño, puede provocar la formación de calcio.

No se esterilice. El paquete de suministro estéril a menos que el paquete esté abierto o dañado. Deseche las suturas abiertas que no se hayan utilizado. Almacenar a temperatura ambiente. Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas.

Los usuarios deben estar familiarizados con las técnicas y los procedimientos quirúrgicos que emplean el uso de suturas antes de emplear las suturas de poliéster no absorbibles Ti-Cron™. La dehiscencia de la herida puede variar en función de la habilidad de aplicación y del material de sutura empleado.

Debe seguirse una práctica quirúrgica aceptada en el drenaje y cierre de heridas infectadas o contaminadas.

PRECAUCIONES
Tener cuidado en el uso de cualquier sutra material de suturas requiere extremar las precauciones para evitar que se dañe al manipularlo. Evite aplastamientos o abrasiones provocadas por instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o portagujas.

Para asegurar que el nudo no ceda, firme y se corra y/ó que de nudo plano y cuadrado con cuadrado adicionales según lo requieran las circunstancias quirúrgicas y según la experiencia del cirujano. La utilización de nudos adicionales puede ser especialmente apropiada cuando se atan los monofilamentos.

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos adversos que pueden asociarse al uso de este dispositivo incluyen: dehiscencia de la herida; formación de cálculos cuando exista un contacto prolongado con soluciones salinas; aumento de la capacidad de infección bacteriana; mínima reacción inflamatoria aguda, e irritación local puntiforme.

CÓMO SE SUMINISTRA
Las suturas de poliéster Ti-Cron™ incoloras (blancas) o teñidas con colorante SIMC Azul N. 6, esterilizadas, revestidas y no revestidas, en tamaños 12 (Metric 7) y 10-0 (Metric 0,4) sobre una gama de agujas y longitudes. Las agujas de suturas de poliéster Ti-Cron™ están disponibles en varios tipos de agujas, con anclaje permanente o de cloaca. Las suturas de poliéster Ti-Cron™ están también disponibles en cajas de una, dos y tres docenas. Las suturas de poliéster Ti-Cron™ son también suministradas con almohadillas de PTFE (politetrafluoroetileno) para utilizarse como tampones para la zona de sutura y para reducir la tensión sobre el material. Los extremos de sutura son los más finos para incrementar la zona de apoyo de bola.

NL

Polyester gevlochten met coating

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE ZORGVULDIG VOOR VOORGEBRUIK IN HET PRODUCT GEBRUIKT.

BESCHRIJVING
Ti-Cron™ gevlochten polyester hechtdraad is niet-absorbeerbaar, steriele, chirurgische hechtdraad die bestaat uit polyethylenetereftalaat. Het hechtdraad wordt vervaardigd uit vezels met een hoog molecuul gewicht, aanwezig uit langs lineire, lanssuiten linear polyesters met de aanwezigheid van terugkerende aromatische ringen. Ti-Cron™ gevlochten hechtdraad is verdeeldsgewijs met een siliconen oppervlaktelaag. Deze dient ter verbetering van de hanteerbaarheid, de doorgang van de naald door het weefsel en de knoopsterkte. Ti-Cron™ hechtdraden zijn inert en veroorzaken slechts een minimale gewrichtsreaktie. Ti-Cron™ gevlochten hechtdraden zijn gekleurd met SIMC Blauw No. 6 of ongekleurd (wit).

Ti-Cron™ hechtdraad voldoet aan de eisen van de Amerikaanse (USP) en Europese (EP) Farmacopeeën voor niet-absorbeerbare chirurgische hechtdraden.

INDICATIES
Ti-Cron™ polyester hechtdraad is geïndiceerd voor gebruik bij algemene hechting en/of ligering van zachte weefsels, waaronder ook gebruik bij hart- en vaatchirurgie, oftalmologie en neurologie.

WERKWIJZE
Ti-Cron™ polyester hechtdraad veroorzaakt een minimale acute ontstekingsreactie in weefsel, waarna het hechtdraad geleidelijk door vezelig bindweefsel wordt omsloten. Ti-Cron™ polyester hechtdraad wordt niet geabsorbeerd en ondergaat voor zover bekend in vivo geen significante verandering in trekkracht.

CONTRA-INDICATIES
Er zijn geen contra-indicaties bekend.

WAARSCHUWINGEN
Net als bij alle vreemde lichamen kan langdurig contact van een hechting met weefsel tot calciumafzetting leiden.

Niet opnieuw steriliseren. De hechtdraden zijn steriel, tenzij bijde de verpakking geopend of beschadigd. Ongebruikte hechtdraden dienen te worden weggegooid. Bewaren bij kamertemperatuur. Vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen.

Gebruikers dienen vertrouwd te zijn met de chirurgische procedures en technieken van hechtdraden, voordat ze Ti-Cron™ polyester gevlochten hechtdraden gebruiken. De wondheling hangt af van de vaardigheid van de toepasser en van de gebruikte hechtdraden.

Toepassing van de juiste chirurgische technieken is van belang bij de drainage en sluiting van geïnfecteerde, zieke of vervuilde wunden.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als u de material of een ander technisch material gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u het niet beschadigt door ongeoorloofde manipulatie. Voorkom dat u de hechtdraden wanneer u chirurgische instrumenten als tangen en naaldhouders gebruikt.

De knoopen hebben voldoende zekerheid nodig, zoals platte knopen, chirurgische technieken van platte, vierkante knopen met extra knoots hanteert, afhankelijk van de chirurgische omstandigheden en de ervaring van de chirurg. Het gebruik van extra knoots is met name van te pas bij het knopen van monofilamenten.

BIJWERKINGEN
Bijwerkingen die kunnen worden geassociëerd met het gebruik van dit product, zijn onder anderen: wondheling; verkalkvorming, wanneer sprake is van langdurig contact met oplossingen; verhoogde kans op bacteriën; minimale acute ontstekingsreactie en lokaal weefselirritatie.

LEVERINGSVORM
Ti-Cron™ polyester hechtdraden zijn uitverdeel (ivoor) of kleur met SIMC Blauw No. 6 sterilisatie, coating en niet-coating, in maten 12 (Metric 7) tot 10-0 (Metric 0,4) op verschillende naalden en in verschillende lengtes. Ti-Cron™ polyester hechtdraad naalden zijn aangeboden in verschillende naaldtypes, zowel met permanente als aanhechtbare naaldbevestigingstechniek gebruikt, zowel naar Ti-Cron™ polyester hechtdraden in kartonnen doos van 1, 2 en 3 dozijn. Ook zijn Ti-Cron™ polyester hechtdraden voorzien van PTFE (polytetrafluoroethylene) vlokjes, die dienen als tampon voor de hechtdraad. De uiteinden van de hechtdraden zijn de dunste hechtdraden om de contactoppervlakte van de bolvormige hechtdraden te vergroten.

SV

Ytbehandlad, flätad polyester

LÄS NOGGRANNT INFORMATION NEDAN INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK.

BESKRIVNING
Ti-Cron™ flätade polyestersuturer är icke-resorberbara, sterila, kirurgiska suturer bestående av polyetyleneftalat. De framställs av fibrer av lågmo linjära polyesterfibrer med hög molekylvikt som kvadratiskt av en integrerad upprepad aromatisk ringar. Ti-Cron™ flätade suturer finns att få genre ytbehandlad med silikon för att minska friktionen, vilket gör suturen lättanvänd och underlättar passage genom vävnad och minskar knutens storlek. Ti-Cron™ suturer är inert och framkallar minimal vävnadsreaktion. Ti-Cron™ suturer finns att få med SIMC blå nr 6 eller ofärgade (vitaktiga).

Ti-Cron™ suturer uppfyller alla de krav som ställs av United States Pharmacopeia (USP) och Europeiska Farmakopéer (EP) för icke-resorberbara kirurgiska suturer.

INDIKATIONER
Ti-Cron™ polyestersuturer är indicerade för allmänt bruk vid vävnadsapproximation och/eller ligatur, inklusive vid kirurgi av hjärt och kärl, ögon och nervsystem.

VERKNINGSSÄTT
Ti-Cron™ polyestersuturer ger upphov till en minimal akut inflammatorisk reaktion i vävnaden, som sedan ersätts av en gradvis inkapsling av suturen av fibrös bindvävnad. Ti-Cron™ polyestersuturer absorberas inte, och det finns inga kända ändringar av betydelse i dragstyrka som uppstår i vivo.

KONTRAINDIKATIONER
Inga kända.

VARNING
Likom med alla främmande kroppar, kan långvarig kontakt mellan suturen och vävnaderna leda till kalkavlagringar.

Om en vävnadsskada, levrätt eller i skorsten och sekundär blackning. Kasera oöppnade, osterila suturer. Förvaras vid rumstemperatur. Undvik att utsätta för höga temperaturer under längre tid.

Innan man börjar använda Ti-Cron™ polyesterflätade suturer bör man vara bekant med kirurgiska tekniker och metoder som tillämpas vid suturer. Ti-Cron™ polyesterflätade suturer bör användas av kirurgi som är vana vid kirurgiska tekniker och produktkunskap om produkterna.

Vid kirurgisk suturering av dränering och sluten sår bör man vara uppmärksam.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Ett bra sätt att undvika att skada suturen vid hantering av det det material som utförsvinner vid hantering av det material som det material som det material som